

Что необходимо знать, чтобы избежать проблем с пирсингом?

Пирсинг – одно из самых модных украшений среди молодежи на сегодняшний день. Молодые люди прокалывают себе практически все что можно: уши, пупок, губы, брови, язык, крылья носа, соски и половые органы. Пирсингом называется и само прокалывание, и то, что вдевается в отверстия.

Если вы решили выделиться, привлечь к себе внимание при помощи пирсинга, вы обязательно должны обратиться к специалисту, имеющему на это лицензию, так как обратившись к любителю или попытавшись самостоятельно сделать пирсинг, вы подвергаете себя огромному риску (инфекции, заражение крови, повреждение важных мышц и нервов, сильные кровопотери и др.).

Вы должны узнать все плюсы и минусы прокалывания. У пирсинга кроме недостатков (связанных с рисками инфекций) есть и множество преимуществ: он выглядит очень эффектно, стимулирует эрогенные зоны, увеличивает и обостряет сексуальные ощущения (пирсинг в интимных зонах и на сосках).

Существуют два вида пирсинга: первичный и вторичный. Первичный пирсинг – это пирсинг из биологически инертных материалов – платины, титана, хирургической стали или высокопробного золота. Первичный пирсинг носится после прокола, до заживания ранки. Нужно учесть период заживления в разных зонах. Например, прокол соска заживает 3-5 месяцев, прокол ушных мочек – 3-4 месяца, а хряща – до 6-ти месяцев. Пирсинг половых органов заживает одинаково быстро и у мужчин и у женщин – около месяца.

Вторичный пирсинг может быть из любого другого материала (слоновой кости, дерева, металла, пластмассы и т. д.). Его можно носить строго после заживления. Встречаются люди с аллергической реакцией на металлы. В их случае можно попробовать украшение из неаллергенного сплава титана или золота 750 пробы.

В техническом отношении процедура пирсинга совершенно проста. И все-таки, от ошибок специалистов и последующих осложнений не застрахован никто. Если вы

вовремя заметите осложнения в процессе заживания после установки пирсинга, сразу же обращайтесь за помощью к доктору (дерматологу). Таким образом вы предотвратите множество проблем, которые могут возникнуть вследствие прокалывания нежных участков тела. Если же после принятых мер ранка не пройдет, вам, к сожалению, придется отказаться от выбранного для пирсинга украшения или даже от самой идеи пирсинга.

Нужно узнать, каким образом мастер, которого вы выбрали, стерилизует инструменты. Для стерилизации у него должен быть хотя бы автоклав. Кроме инструментов, он должен простерилизовать также и украшение.

Обязательно попросите специалиста предоставить вам всю информацию о введении пирсинга и об особенностях ухода за ним.

- Во избежание нежелательных инфекций, заражений или абсцесса – внимательно следите за процессом заживания проколотого участка.
- Первые 2 недели после прокалывания не следует посещать бассейн, сауну, купаться в море и других природных водоемах.
- После прокалывания соска или пупка рекомендуется надевать на ночь чистую хлопчатобумажную футболку или майку.
- При генитальном пирсинге нужно не входить в сексуальные отношения до полного заживления.
- После процедуры пирсинга полости рта или периоральной области, желательно воздержание от курения и употребления алкоголя. Каждый раз после еды или питья обязательно полоскание рта дезинфицирующим раствором.
- В течение недели после прокалывания, нужно периодически передвигать украшение в формирующемся канале, чтобы предотвратить засыхание.

Процедура пирсинга противопоказана людям с психическими расстройствами, с эпилепсией и людям, перенесшим черепно-мозговые травмы, при наличии и обострении хронических, системных или кожных заболеваний, тем, у кого бронхиальная астма, кожные заболевания в зоне прокола, врожденные пороки сердца. Также нельзя производить пирсинг людям с болезнями крови, гепатитом В и С, с сахарным диабетом, лейкозом и ВИЧ-инфицированным;

Поскольку пирсинг воспринимается организмом как травма, женщинам не

Что необходимо знать, чтобы избежать проблем с пирсингом

Автор: admin

03.06.2014 15:03 -

рекомендуется делать пирсинг в предменструальный период, во время самой менструации или во время беременности.

Автор - **Дина Маркова**

[Источник](#)