

По мнению специалистов, существует три основные причины женского бесплодия: нарушения овуляции, непроходимость маточных труб и эндометриоз, при котором частички эндометрия отделяются и прирастают к брюшной полости. Основной причиной мужского бесплодия являются изменения в сперме либо недостаточным ее количеством. Как у мужчин, так и у женщин бесплодие может быть вызвано наследственными причинами.

У детей женщин, которые принимали во время беременности запрещенный в наше время искусственный гормон диетилstilбестрол, с большой вероятностью могут иметь отклонения в репродуктивной системе, влияющие на фертильность. В некоторых случаях (3 - 20 %) причины бесплодия выявить не удастся.

Большую часть пар, желающих провести лечение бесплодия, лечат консервативными и хирургическими методами, начиная от обычного исследования, по результатам которого выбирается наилучшее время для зачатия, до хирургического вмешательства с целью исправления недостатков; бесплодие можно вылечить устранением непроходимости труб, удалением миом, лечением эндометриоза. В случае проблем, связанных с овуляцией, могут назначить лекарства, стимулирующие овуляцию. Гормональную терапию используют и при эндометриозе, и при некоторых типах мужского бесплодия.

Другие методы лечения бесплодия включают:

Искусственное оплодотворение спермой мужа (если она пригодна для удачного оплодотворения), либо спермой донора.

Оплодотворение в пробирке - яйцеклетки извлекаются из яичников женщины хирургическим путем и переносятся в чашу Петри для оплодотворения спермой. Затем уже оплодотворенные яйцеклетки помещают в матку пациентки.

Пересадка гамет в трубы - извлеченные яйцеклетки пациентки смешивают со спермой, после чего они помещаются в фаллопиевы трубы для оплодотворения.

Пересадка зигот - яйцеклетки женщины оплодотворяют и уже эмбрионы помещают в матку.