Автор: admin
31.07.2011 07:54 - Обновлено 04.11.2014 12:13

Существуют простые и доступные методы выявления наступившей беременности. Разумеется, полной гарантии не дает ни одна методика, и окончательное заключение вы можете получить только после осмотра врача и дополнительного обследования в клинике. Но в первые 10-12 дней задержки менструации даже в специализированном лечебном учреждении не смогут дать точный ответ при наличие беременности.

Если менструация не наступает в ожидаемый день, то, начиная со следующего утра, вы можете измерять температуру в прямой кишке. Обычный медицинский термометр необходимо ввести в прямую кишку сразу после пробуждения. При этом нельзя вставать с постели - рекомендуется заранее положить термометр около кровати. Ночной сон должен быть не менее 6 часов.

Термометр вводят за мышцу, сжимающую заднепроходное отверстие, на глубину 2 см на 5-7 минут. Зафиксируйте показания термометра. Процедуру необходимо проводить ежедневно в течение 7-10 дней.

Если температура в прямой кишке стабильно превышает 37 ° С, то это свидетельствует в пользу возможной беременности.

При задержке менструации на 3 дня и более вы можете использовать тест для ранней диагностики беременности. Он прост и достаточно достоверен. Точность ответа будет выше, если вы проведете исследование 2-3 раза.

В основе тестов лежит химическая реакция на специфический гормон (хорионический гонадотропин - ХГ), который начинает вырабатываться в организме женщины во время беременности. Для исследования лучше брать утреннюю порцию мочи: после ночного сна концентрация гормона и продуктов его распада увеличивается. Также можно сдать мочу на определение количественного содержания ХГ в клинике.

И вот прошло 3-4 недели, вы убедились, что температура в прямой кишке устойчиво выше 37 ° С, тест на беременность дважды дал положительный результат. При этом ваше самочувствие прекрасно, субъективных расстройств нет, вы ощущаете прилив сил, эмоциональный подъем. Стоит ли идти в женскую консультацию? Стоит.

В первую очередь - чтобы удостовериться в том, что плодное яйцо имплантировалось в полости матки.

Дело в том, что само зачатие происходит вне полости матки, и оплодотворенная яйцеклетка должна добраться до места имплантации по маточной трубе. И если на пути плодного яйца встречаются препятствия в виде сужений в маточной трубе или трубном угле матки или же оплодотворенная яйцеклетка слишком долго продвигается по маточной трубе, и плодное яйцо уже чересчур велико для просвета маточной трубы, то оно не попадает в полость матки.

Возникает эктопическая, или внематочная, беременность. Следует помнить, что внематочная беременность на ранних сроках дает точно такие же качественные реакции, что и маточная: они универсальны для беременности вообще.