МЕТОД ПОСТОЯННЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ

Автор: словарь
07.11.2008 22:08 -

Метод постоянных раздражителей (синонимы: метод констант, частотный метод) — метод измерения порога, заключающийся в определении относительной частоты положительного ответа испытуемого на каждый член из стимулов изолированного ряда. Стимул предъявляется испытуемому одинаковое количество раз в случайном порядке.

Классический М. п. р. не предусматривает пустых проб.

Однако в современной практике их иногда включают в опыт, поскольку это позволяет получить ответы типа ложной тревоги и на их базе определить долю положительных ответов, даваемых испытуемым на основе не имеющихся ощущений, а догадки, соответственно чему при обработке результатов вносится необходимая коррекция с помощью поправки на случайный успех, предложенная Г. Блеквеллом.

Система ответов, которые должен давать испытуемый, либо состоит из двух альтернативных ответов ("есть", "нет" или их аналогов), либо допускает третий — нейтральный ответ (типа: "не знаю", "сомневаюсь"). В последнем случае, если нейтральные ответы не представляют в соответствии с замыслом исследователя самостоятельной ценности, то при обработке результатов их распределяют поровну между двумя основными видами ответов или пропорционально числу положительных и отрицательных ответов, полученных при предъявлении данного стимула. По результатам опыта строится психометрическая кривая, с помощью которой может быть найдено значение раздражителя, соответствующего любой вероятности обнаружения.

Раздел V. Методы исследования