Психиатрического состояния шкала (Psychiatric status shedule) — опросник, предназначенный для скрининга психических расстройств. Разработан Л. Спицером, Дж. Эндикотом, Дж. Флейссом, Дж. Коэном в 1964 г. В 1970 г. опубликована повторно с изменениями после стандартизации на выборке из 2000 испытуемых. П. с. ш. охватывает перечень из 321 симптомов, которые образуют 17 симптоматических шкал ("депрессия-тревога", "социальная изоляция", "суицидность", "соматические жалобы", "нарушения речи", "необычные эмоции", "внешний вид или поведение", "ажитация-возбуждение", "враждебность-негативизм", "дезориентация-нарушения памяти", "ретардация-недостаток эмоций", "антисоциальные установки или поступки", "проявления гнева", "мания величия", "подозрительность-галлюцинации"); и шесть ролевых шкал: ("роль кормильца", "роль хозяйки дома", "роль студента или ученика", "роль товарища", "роль родителя", "итоговая роль"). Факторный анализ пунктов, входящих в симптоматические шкалы, позволил выделить так называемые "шкалы суммирования симптомов": 1. Удрученность; 2. Расстройства поведения; 3.

Расстройства контроля за импульсами; 4. Нарушения чувства реальности. Выделяются также 3 дополнительные шкалы, не имеющие психометрического обоснования, выделенные исключительно для удобства клинического психолога или психиатра: "особенности проведения свободного времени", лекарственная или наркотическая зависимость", "алкогольная зависимость".

Испытуемому предлагается ответить, свойственны ли ему те или иные особенности, указанные в перечне П. с. ш. Баллы, полученные по шкалам, переводятся в стандартные. П. с. ш. обладает достаточной валидностью и надежностью при исследовании 25 больных, поступивших на лечение, спустя двое суток и спустя неделю после поступления. Поведенческие шкалы более стабильны, чем шкалы психического состояния. П. с. ш. имеет высокие показатели валидности текущей, определенной по методу контрастных групп (исследовались психически здоровые, больные неврозами, шизофренией, алкоголизмом, органическим мозговым синдромом).

Лучше всего дифференцируют психически больных от здоровых шкалы "депрессии-тревоги", "итоговая роль", "роль кормильца", "особенности проведения свободного времени", "удрученность". Имеются также сведения о достаточной валидности конструктивной П. с. ш. по корреляции с данными обследования с помощью различных психиатрических оценочных шкал. Методику рекомендуется применять в эпидемиологических исследованиях, а также в дифференциальной диагностике психических расстройств.

ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКАЛА

Автор: словарь
18.05.2009 17:48 -

Л. Ф. Бурлачук

Раздел 6. Методы и психодиагностика в клинической психологии