

Тики (в клинической психологии) — привычные быстрые, произвольные, стереотипно повторяющиеся движения (мигание, наморщивание лба, подергивание головой, плечами, «хрюкающие» и «хмыкающие» звуки). Возникают обычно в возрасте 3—7 лет у 4,5% мальчиков и 2,6% девочек, воспринимаются ими как чуждые, болезненные, как дурная привычка, могут быть на время подавлены с помощью воли, однако, это требует усилий и вызывает напряжение. Дети, увлеченные игрой или чтением, не замечают Т., подростки стесняются их. Примерно в 2 из 3 случаев Т. имеют невротическую природу, связаны с особой (не всегда патологической) реакцией ребенка на дисгармонию в семье. В этом случае специального лечения не требуется, психологическая разгрузка и семейная коррекция облегчает состояние, по мере взросления Т. проходят совсем, иногда они повторяются у взрослого на фоне стресса. У части больных к Т. позже добавляются страхи и навязчивые действия (обсессивно-фобический невроз). Менее благоприятно течение распространенных (генерализованных) Т. в виде подергиваний разных частей тела, вскриков, произнесения бранных слов (синдром Жиля де ля Туретта), в этом случае Т. прогрессируют, требуется постоянное лекарственное лечение. Стереотипные Т., которые ребенок не чувствует и не замечает, следует дифференцировать с эпилепсией. Для исключения органических заболеваний и эпилепсии требуется консультация врача-психиатра.

Ю. Г. Тюльпин